

Test radiológico

Antonia Arrate V.⁽¹⁾, Daniela Méndez M.⁽¹⁾, Loreto Lara P.⁽¹⁾, Camilo Leal M.⁽¹⁾, Camila Yáñez A.⁽²⁾, Lizbet Pérez M.⁽²⁾




⁽¹⁾Centro de Imagenología, Hospital Clínico Universidad de Chile

⁽²⁾Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna

CASO 1

Paciente masculino de 11 años que consulta por un cuadro de 3 días dolor abdominal intenso en fosa ilíaca izquierda asociado a vómitos y que luego migra hacia la región inguinoescrotal izquierda. Presenta disminución parcial del dolor en 24 horas, pero éste recurre a las 48 horas y se suma aumento de volumen y color violáceo del testículo izquierdo. En servicio de urgencia se sospecha escroto agudo y se solicita una ecografía testicular.

Ecografía testicular:




Disponibles en color en: <https://www.redclinica.cl/actividad-academica/revista/noticia-revista/newsid/2985.aspx>

CASO 2

Paciente masculino de 13 años con cuadro de dolor testicular izquierdo asociado a náuseas y vómitos, por lo que consulta en el servicio de urgencia. Al examen físico destaca signo Gouverneur positivo y testículo aumentado de tamaño, por lo que se sospecha escroto agudo y se solicita una ecografía testicular.

Ecografía testicular:



Disponibles en color en: <https://www.redclinica.cl/actividad-academica/revista/noticia-revista/newsid/2985.aspx>

¿Cuál es el diagnóstico?

(Ver resultado en página 135)